

World Heart Day



ആകസ്മിക ഹൃദയാഘാതത്തിൽ പ്രതിവർഷം മരണം കാൽലക്ഷം

ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് പഠനം വ്യാപകമാക്കണം

കെ.എസ്.അരവിന്ദ്

തിരുവനന്തപുരം: ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിവർഷം മരിക്കുന്നത് ശരാശരി 25,000 പേർ. ഹൃദ്രോഗവിദഗ്ദ്ധർ സ്വരൂപിച്ച കണക്കാണ് ഇത്. സാധാരണ മരണങ്ങളിൽ 10 ശതമാനം ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഒരടിവസം ശരാശരി 70 പേർ ആകസ്മിക ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ മരിക്കുന്നു. കഴഞ്ഞുവീണ്ടുള്ള മരണം, ഉറക്കത്തിനിടെയുള്ള മരണം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം പ്രധാന കാരണം ആകസ്മിക ഹൃദയാഘാതമാണ്. വ്യാപകമായി മാറിയ ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ ചെറുക്കാൻ ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് പഠനം വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന് ശ്രീചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹെൽത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ കാര്യീയോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോ.കെ.കെ.നാരായണൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു. കഴഞ്ഞുവീഴുന്ന വ്യക്തിക്ക് മിനിട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ സി.പി.ആർ (കാർഡിയോപൾമനറി റെസ്പിറേറ്റോറി) നൽകാനായാൽ മരണങ്ങൾ കുറയാനാകും. സാധാരണ പ്രായമായവരിലാണ് ആകസ്മിക ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്നത്. വിദേശരാ

സാധ്യതയുള്ളവർ



1. ഇടത്ഭാഗത്തെ ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്നവർ
2. ഹൃദയത്തിന്റെ സങ്കോച ശക്തി കുറവുള്ളവർ
3. അമിതമായി ഹൃദയമിടിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നവർ
4. ആകസ്മിക ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ



“ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് നൽകാൻ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും മുന്നോട്ടുവരണം. അതിനുപരിശീലനം നൽകാൻ ശ്രീചിത്ര സന്നദ്ധമാണ്. -ഡോ.കെ.കെ.നാരായണൻ നമ്പൂതിരി പ്രൊഫസർ കാര്യീയോളജി വിഭാഗം ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ജ്യങ്ങളിൽ 55-60 വയസിനിടയിലുള്ളവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 45-50 വയസിനിടയിലുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ മരിക്കുന്നത്. ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടാകുന്നതു മൂലം അവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിലയ്ക്കും. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അഞ്ചുമുതൽ എട്ടുമിനി

മരണക്കണക്കുകൾ

കേരളത്തിൽ പ്രതിവർഷം ശരാശരി മരണം.....	2,50,000
ആകസ്മിക ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നുള്ളത്.....	25,000 (10%)
പ്രതിമാസം ശരാശരി	
ആകസ്മിക മരണം.....	20,833
ആകസ്മിക ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നുള്ള മരണം.....	2083 (10%)
പ്രതിദിനം ശരാശരി	
ആകസ്മിക മരണം.....	695
ആകസ്മിക ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നുള്ള മരണം.....	70 (10%)

വളരെ പിന്നിലാണ്. കേരളീയർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും ബോധവാന്മാരല്ല. **സി.പി.ആർ?** കഴഞ്ഞുവീണ്ടയാളെ മലർത്തിക്കിടത്തി നെഞ്ചിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു കൈവച്ച് അതിനുമുകളിലായി മറ്റൊന്ന് വെച്ചു താഴേക്കും മുകളിലേക്കും ശക്തമായി അമർത്തണം. ഹൃദയസ്തംഭനം സംഭവിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നുമിനിറ്റുകളിൽ സി.പി.ആർ നൽകിത്തുടങ്ങണം. ചെറിയ മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാൻ നിറുത്തരുത്. അത്ഭിവാണെ ബാധിക്കും. ഡോക്ടർമാരുടെ കൈകളിൽ രോഗിയെ എത്തിക്കുന്നതു വരെ ദൗത്യം തുടരണം.